



RICHTLINIEN NACH PHIMOSE-OPERATION

Nach Entlassung:

- Kamillenbäder 2 x täglich
- Baneocinsalbe 2 x täglich nach dem Bad

Nach ambulanter Kontrolle:

- Vorsichtiges Zurückziehen und wieder Vorschieben der Vorhaut in oder nach jedem Bad - jedoch nur soweit es leicht möglich ist und keine Schmerzen auftreten! Ältere Patienten sollen diese Prozedur selbst durchführen.
- Reinigen mit einem Wattestäbchen mit Kinderöl bis zum vollständigen Rückgang der operationsbedingten Schwellung

Nach vollständiger Abheilung:

- Beendigung der Bäder-Salbenbehandlung erst, wenn keine Beschwerden, keine Rötung vorliegen
- Bei einigen Patienten kommt es in den ersten Wochen zu einer starken Narbenreaktion, die in der Regel von alleine zurückgeht. Eine endgültige Beurteilung des Operationsergebnisses ist daher erst nach 6 Monaten sinnvoll.

Ambulante Kontrollen:

- 7 bis 9 Tage nach der Entlassung.
- Weitere Kontrollen je nach Befund.

**Bei akuten Beschwerden sofortige Vorstellung
in der Ambulanz erbeten!**

